

Fórmulas de Cálculo Diferencial e Integral

ACTUALIZADO AGO-2007
Jesús Rubí Miranda (jesrubim@yahoo.com)

Móvil. Méx. DF. 044 55 13 78 51 94

1. VALOR ABSOLUTO

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$$|a| = |-a|$$

$$a \leq |a| y -a \leq |a|$$

$$|a| \geq 0 y |a|=0 \Leftrightarrow a=0$$

$$|ab| = |a||b| \quad 6 \prod_{k=1}^n |a_k| = \prod_{k=1}^n |a_k|$$

$$|a+b| \leq |a|+|b| \quad 6 \sum_{k=1}^n |a_k| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$$

2. EXPONENTES

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

$$(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$$

3. LOGARITMOS

$$\log_a N = x \Rightarrow a^x = N$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a N' = r \log_a N$$

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} = \frac{\ln N}{\ln a}$$

$$\log_{10} N = \log N / \log_e 10 = \ln N$$

4. ALGUNOS PRODUCTOS

$$a \cdot (c+d) = ac+ad$$

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a+b) \cdot (a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b) \cdot (a-b) = (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(x+b) \cdot (x+d) = x^2 + (b+d)x + bd$$

$$(ax+b) \cdot (cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$

$$(a+b) \cdot (c+d) = ac+ad+bc+bd$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$(a-b) \cdot (a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a-b) \cdot (a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4) = a^5 - b^5$$

$$(a-b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n a^{n-k} b^{k-1} \right) = a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned} (a+b) \cdot (a^2 - ab + b^2) &= a^3 + b^3 \\ (a+b) \cdot (a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) &= a^4 - b^4 \\ (a+b) \cdot (a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) &= a^5 + b^5 \\ (a+b) \cdot (a^5 - a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4 - b^5) &= a^6 - b^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1} \right) &= a^n + b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ impar} \\ (a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1} \right) &= a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ par} \end{aligned}$$

5. SUMAS Y PRODUCTOS

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$$

$$\sum_{k=1}^n [a + (k-1)d] = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$= \frac{n}{2}(a+l)$$

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = a \frac{1-r^n}{1-r} = \frac{a-rl}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}(n^2 + n)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4}(n^4 + 2n^3 + n^2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{1}{30}(6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n)$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}, \quad k \leq n$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^n = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_k} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k}$$

6. CONSTANTES

$$\pi = 3.14159265359\dots$$

$$e = 2.71828182846\dots$$


7. TRIGONOMETRÍA

$$\sin \theta = \frac{CO}{HIP} \quad \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{CA}{HIP} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\tg \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{CO}{CA} \quad \ctg \theta = \frac{1}{\tg \theta}$$

$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ$$



θ	sin	cos	tg	ctg	sec	csc
0°	0	1	0	∞	1	∞
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$	$2/\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	2	$2/\sqrt{3}$
90°	1	0	∞	0	∞	1

$$y = \angle \sin x \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$y = \angle \cos x \quad y \in [0, \pi]$$


$$y = \angle \tg x \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

$$y = \angle \ctg x = \angle \tg \frac{1}{x} \quad y \in (0, \pi)$$


$$y = \angle \sec x = \angle \cos \frac{1}{x} \quad y \in [0, \pi]$$

$$y = \angle \csc x = \angle \sen \frac{1}{x} \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$


Gráfica 1. Las funciones trigonométricas: $\sin x$, $\cos x$, $\tg x$:




Gráfica 2. Las funciones trigonométricas $\csc x$, $\sec x$, $\ctg x$:



Gráfica 3. Las funciones trigonométricas inversas $\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctg x$:



Gráfica 4. Las funciones trigonométricas inversas $\text{arcsec } x$, $\text{arcsecsc } x$:



8. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \ctg^2 \theta = \csc^2 \theta$$

$$\tg^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\tg(-\theta) = -\tg \theta$$

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$$

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

$$\tg(\theta + 2\pi) = \tg \theta$$

$$\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$$

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$$

$$\tg(\theta + \pi) = \tg \theta$$

$$\sin(\theta + n\pi) = (-1)^n \sin \theta$$

$$\cos(\theta + n\pi) = (-1)^n \cos \theta$$

$$\tg(\theta + n\pi) = \tg \theta$$

$$\sin(n\pi) = 0$$

$$\cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$\tg(n\pi) = 0$$

$$\sin\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = (-1)^n$$

$$\cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = 0$$

$$\tg\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = \infty$$

$$\sin \theta = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\cos \theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tg(\alpha \pm \beta) = \frac{\tg \alpha \pm \tg \beta}{1 \mp \tg \alpha \tg \beta}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\tg 2\theta = \frac{2\tg \theta}{1 - \tg^2 \theta}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$$

$$\tg^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\tg \alpha \pm \tg \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$$

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\tg \alpha \cdot \tg \beta = \frac{\tg \alpha + \tg \beta}{\tg \alpha \cdot \tg \beta}$$

9. FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$


$$\tgh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\ctgh x = \frac{1}{\tgh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\sech x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\csch x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

Gráfica 5. Las funciones hiperbólicas $\sinh x$, $\cosh x$, $\tgh x$:



10. FUNCIONES HIPERBÓLICAS INV

$$\sinh^{-1} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh^{-1} x = \ln\left(x \pm \sqrt{x^2 - 1}\right), \quad x \geq 1$$

$$\tgh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \quad |x| < 1$$

$$\ctgh^{-1} x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right), \quad |x| > 1$$

$$\sech^{-1} x = \ln\left(\frac{1 \pm \sqrt{1-x^2}}{x}\right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\csch^{-1} x = \ln\left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|}\right), \quad x \neq 0$$

11. IDENTIDADES DE FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ 1 - \tgh^2 x &= \operatorname{sech}^2 x \\ \operatorname{ctgh}^2 x - 1 &= \operatorname{csch}^2 x \\ \sinh(-x) &= -\sinh x \\ \cosh(-x) &= \cosh x \\ \tgh(-x) &= -\tgh x \\ \sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \\ \tgh(x \pm y) &= \frac{\tgh x \pm \tgh y}{1 \pm \tgh x \tgh y} \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x \\ \cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x \\ \tgh 2x &= \frac{2 \tgh x}{1 + \tgh^2 x} \end{aligned}$$

$$\sinh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1)$$

$$\cosh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1)$$

$$\tgh^2 x = \frac{\cosh 2x - 1}{\cosh 2x + 1}$$

$$\tgh x = \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x + 1}$$

$$e^x = \cosh x + \sinh x$$

$$e^{-x} = \cosh x - \sinh x$$

12. OTRAS

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$b^2 - 4ac$ = discriminante

$$\exp(\alpha + i\beta) = e^\alpha (\cos \beta + i \sin \beta) \quad \text{si } \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

13. LÍMITES

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e = 2.71828\dots$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} = 1$$

14. DERIVADAS

$$D_x f(x) = \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(cx) = c$$

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = ncx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(u \pm v \pm w \pm \dots) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx} \pm \dots$$

$$\frac{d}{dx}(cu) = c \frac{du}{dx}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(uvw) &= uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v(uv') - u(vu')}{v^2} \\ \frac{d}{dx}(u^n) &= nu^{n-1} \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (\text{Regla de la Cadena})$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{dx/du}$$

$$\frac{dF}{dx} = \frac{dF}{du} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{f_1'(t)}{f_1(t)} \quad \text{donde } \begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases}$$

15. DERIVADA DE FUNCIONES LOG & EXP

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{du}{u} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\log u) = \frac{\log e}{u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{\log_a e}{u} \frac{du}{dx}, \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1} \frac{du}{dx} + \ln u \cdot u^v \frac{dv}{dx}$$

16. DERIVADA DE FUNCIONES TRIGO

$$\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tg u) = \sec^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\ctg u) = -\csc^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u \tg u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u \ctg u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\versus u) = \sen u \frac{du}{dx}$$

17. DERIVADAS DE FUNCIONES TRIGO INVER

$$\frac{d}{dx}(\angle \sin u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \cos u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \tg u) = \frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \ctg u) = -\frac{1}{1+u^2} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \sec u) = \pm \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} + \text{ si } u > 1 \\ - \text{ si } u < -1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \csc u) = \mp \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } u > 1 \\ + \text{ si } u < -1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\angle \versus u) = \frac{1}{\sqrt{2u-u^2}} \frac{du}{dx}$$

18. DERIVADA DE FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\tgh u) = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\ctgh u) = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u \tgh u \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u \frac{du}{dx}$$

19. DERIVADA DE FUNCIONES HIP INV

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{senh}^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{cosh}^{-1} u) = \frac{\pm 1}{\sqrt{u^2-1}} \frac{du}{dx}, \quad u > 1 \quad \begin{cases} + \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u > 0 \\ - \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u < 0 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{tgh}^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{ctgh}^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2} \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} u) = \frac{\mp 1}{u\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u > 0, u \in (0,1) \\ + \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u < 0, u \in (0,1) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0$$

20. INTEGRALES DEFINIDAS, PROPIEDADES

Nota. Para todas las fórmulas de integración deberá agregarse una constante arbitraria c (constante de integración).

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^b cf(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

$$m \cdot (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b-a)$$

$$\Leftrightarrow m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a,b], m, M \in \mathbb{R}$$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a,b]$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{si } a < b$$

21. INTEGRALES

$$\int a dx = ax$$

$$\int af(x) dx = a \int f(x) dx$$

$$\int (u \pm v \pm w \pm \dots) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx \pm \dots$$

$$\int udv = uv - \int vdu \quad (\text{Integración por partes})$$

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{du}{u} = \ln|u|$$

22. INTEGRALES DE FUNCIONES LOG & EXP

$$\int e^u du = e^u$$

$$\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} \quad \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

$$\int ua^u du = \frac{a^u}{\ln a} \left(u - \frac{1}{\ln a} \right)$$

$$\int ue^u du = e^u(u-1)$$

$$\int \ln u du = u \ln u - u = u(\ln u - 1)$$

$$\int \log_a u du = \frac{1}{\ln a} (u \ln u - u) = \frac{u}{\ln a} (\ln u - 1)$$

$$\int u \log_a u du = \frac{u^2}{4} (2 \ln u - 1)$$

23. INTEGRALES DE FUNCIONES TRIGO

$$\int \sin u du = -\cos u$$

$$\int \cos u du = \sin u$$

$$\int \sec^2 u du = \tg u$$

$$\int \csc^2 u du = -\ctg u$$

$$\int \sec u \tg u du = \sec u$$

$$\int \csc u \ctg u du = -\csc u$$

$$\int \tg u du = -\ln|\cos u| = \ln|\sec u|$$

$$\int \ctg u du = \ln|\sin u|$$

$$\int \sec u du = \ln|\sec u + \tg u|$$

$$\int \csc u du = \ln|\csc u - \ctg u|$$

$$\int \sin^2 u du = \frac{u}{2} - \frac{1}{4} \sin 2u$$

$$\int \cos^2 u du = \frac{u}{2} + \frac{1}{4} \sin 2u$$

$$\int \tg^2 u du = \tg u - u$$

$$\int \ctg^2 u du = -(\ctg u + u)$$

$$\int u \sin u du = \sin u - u \cos u$$

$$\int u \cos u du = \cos u + u \sin u$$

24. INTEGRALES DE FUNCIONES TRIGO INV

$$\int \angle \sin u du = u \angle \sin u + \sqrt{1-u^2}$$

$$\int \angle \cos u du = u \angle \cos u - \sqrt{1-u^2}$$

$$\int \angle \tg u du = u \angle \tg u - \ln \sqrt{1+u^2}$$

$$\int \angle \ctg u du = u \angle \ctg u + \ln \sqrt{1+u^2}$$

$$\int \angle \sec u du = u \angle \sec u - \ln(u + \sqrt{u^2-1})$$

$$= u \angle \sec u - \angle \cosh u$$

$$\int \angle \csc u du = u \angle \csc u + \ln(u + \sqrt{u^2-1})$$

$$= u \angle \csc u + \angle \cosh u$$

25. INTEGRALES DE FUNCIONES HIP

$$\int \sinh u du = \cosh u$$

$$\int \cosh u du = \sinh u$$

$$\int \operatorname{sech}^2 u du = \tgh u$$

$$\int \operatorname{csch}^2 u du = -\operatorname{ctgh} u$$

$$\int \operatorname{sech} u \tg u du = -\operatorname{sech} u$$

$$\int \operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u du = -\operatorname{csch} u$$

$$\operatorname{tgh} u du = \ln \cosh u$$

$$\operatorname{ctgh} u du = \ln |\sinh u|$$

$$\operatorname{sech} u du = \angle \tg(\sinh u)$$

$$\operatorname{csch} u du = -\operatorname{ctgh}^{-1}(\cosh u)$$

$$= \ln \operatorname{tgh} \frac{1}{2} u$$

26. INTEGRALES DE FRAC

$$\int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \angle \tg \frac{u}{a}$$

$$= -\frac{1}{a} \angle \ctg \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{u-a}{u+a} \quad (u^2 > a^2)$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \frac{a+u}{a-u} \quad (u^2 < a^2)$$

27. INTEGRALES CON RAIZ

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \angle \sin \frac{u}{a}$$

$$= -\angle \cos \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left(u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right)$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a} + \sqrt{\frac{u^2}{a^2} \pm \frac{1}{a^2}} \right|$$

$$\int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \angle \cos \frac{u}{a}$$

$$= \frac{1}{a} \angle \sec \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \angle \sen \frac{u}{a}$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln \left(u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right)$$

28. MÁS INTEGRALES

$$\int e^{au} \sin bu du = \frac{e^{au} (a \sin bu - b \cos bu)}{a^2 + b^2}$$

$$\int e^{au} \cos bu du = \frac{e^{au} (a \cos bu + b \sin bu)}{a^2 + b^2}$$

$$\int \sec^3 u du = \frac{1}{2} \sec u \tg u + \frac{1}{2} \ln |\sec u + \tg u|$$

$$+ \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} : \text{Taylor}$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!}$$

$$+ \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} : \text{Maclaurin}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

$$\operatorname{tg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

30. ALFABETO GRIEGO

	Mayúscula	Minúscula	Nombre	Equivalente Romano
1	A	α	Alfa	A
2	B	β	Beta	B
3	Γ	γ	Gamma	G
4	Δ	δ	Delta	D
5	E	ϵ	Epsilon	E
6	Z	ζ	Zeta	Z
7	H	η	Eta	H
8	Θ	θ	Teta	Q
9	I	ι	Iota	I
10	K	κ	Kappa	K
11	Λ	λ	Lambda	L
12	M	μ	Mu	M
13	N	ν	Nu	N
14	Ξ	ξ	Xi	X
15	O	\circ	Omicron	O
16	Π	π	Pi	P
17	P	ρ	Rho	R
18	Σ	σ	Sigma	S
19	T	τ	Tau	T
20	Y	υ	Ipsilon	U
21	Φ	ϕ	Phi	F
22	X	χ	Ji	C
23	Ψ	ψ	Psi	Y
24	Ω	ω	Omega	W

31. NOTACIÓN

sin Seno.

cos Coseno.

tg Tangente.

sec Secante.

csc Cosecante.

ctg Cotangente.

vers Verso seno.

 $\arcsin \theta = \angle \sin \theta$ Arco seno de un ángulo θ . $u = f(x)$

sinh Seno hiperbólico.

cosh Coseno hiperbólico.

tgh Tangente hiperbólica.

ctgh Cotangente hiperbólica.

sech Secante hiperbólica.

csch Cosecante hiperbólica.

 u, v, w Funciones de x , $u = u(x)$, $v = v(x)$. \mathbb{R} Conjunto de los números reales. $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ Conjunto de enteros. \mathbb{Q} Conjunto de números racionales. \mathbb{Q}^c Conjunto de números irracionales. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ Conjunto de números naturales. \mathbb{C} Conjunto de números complejos.